

618

F

موسسه آموزش عالی آزاد



ماهان

www.mahan.ac.ir

نام:

نام خانوادگی:

محل امضاء:

عصر جمعه

۹۰/۱۱/۲۰



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی – کد ۱۳۰۵

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	میوه کاری	۳۰	۳۱	۶۰
۳	خاک شناسی و گیاه شناسی	۳۰	۶۱	۹۰
۴	ازدیاد نباتات	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	سبزیکاری و گلکاری	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

1-Currently 80 percent of drugs are shot down in early clinical trials because they are not effective or are even

- 1) intenc 2) initial 3) toxic 4) prior

2-With such rapid advances in the field of human transplantation, researchers such as myself are now beginning to consider what some have previously unthinkable: transplanting a human brain.

- 1) deemed 2) pursued 3)perplexed 4) excluded

3-Weather forecasters are a frequently humbled bunch. NO matter how far their science advances, the atmosphere finds ways to prediction.

- 1) underlie 2) defy 3) expose 4) strive

4-Many armed groups mix with the population to avoid identification. Sometimes they actually use civilians as shields.

- 1) inherently 2)coincidentally 3) persuasively 4) deliberately

5- After receiving a phone call that a domb had been planted somewhere in the hotel, Police ordered the Of the building.

- 1) resistance 2) evacuation 3) authority 4) invalidity

6-Cosmologists, however, can make About the early universe based on the cosmic microwave background radiation, which was emitted about 400,000 years after the big bang.

- 1) concessions 2) ramifications 3) foundations 4) deductions

7-The fact that there are many earth-like planets in the universe supports the widely held view that life The universe.

- 1) pervades 2) innovates 3) exemplifies 4) overlaps

8- Centuries before the development of effective cannons, huge artillery pieces were demolishing castle walls with The weight of an upright piano.

- 1) estimations 2) ensembles 3) barricades 4) projectiles

9-People in their late 90s or older are often healthier and more than those 20 years younger.

- 1) civil 2) durable 3) robust 4) concurrent

10-One of the first prominent geologists to raise concern that global warming might A catastrophic collapse of the Antarctic ice cap was J.H.Mercer.

- 1)trigger 2) negate 3) exceed 4) replace

Part B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Our hunt for caloric restriction mimetics grew out of our desire to better understand caloric restriction's many effects on the body. Scientists firs recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) a low-calorie diet lived longer on what is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group. (14) that the maximum life span (the oldest attainable age). Not merely the average life span, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase (15), but only approaches that slow the body's ratc of aging will increase the maximum life span.

- 11-1) feed 2) they were fed 3) fed 4) feeding

- 12-1) to have 2) had 3) in having 4) and had

13- 1) in old age they became increasingly common

2) that become increasingly common in old age

3) becoming common in increasingly old age

4) they became in old age increasingly common

14-1) which means 2) but means

3) it means 4)what it means

15-1) the average time in survival population

2) a survival population average time

3) a population's average survival time

4) the survival time in average population

Part C. Reading Comprehension

Directions: Read the following three passage and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark the it on your answer sheet.

PASSAGE 1

Losses of horticultural produce are a major problem in the post-harvest chain. They can be caused by a wide variety of factors, ranging from growing conditions to handling at retail level.

Not only are losses clearly a waste of food, but they also represent a similar waste of human effort, farm inputs, livelihoods, investments and scarcc resources such as water. Post-harvest losses for horticultural

produce are, however, difficult to measure. In some cases everything harvested by a farmer may end up being sold to consumers. In others, losses or waste may be considerable. Occasionally, losses may be 100%, for example when there is a price collapse and it would cost the farmer more to harvest and market the produce than to plough it back into the ground. Use of average loss figures is thus often misleading. There can be losses in quality, as measured both by the price obtained and the nutritional value, as well as in quantity. There are numerous factors affecting post-harvest losses, from the soil in which the crop is grown to the handling of produce when it reaches the shop. Pre-harvest production practices may seriously affect post-harvest returns. Plants need a continuous supply of water for photosynthesis and transpiration. Damage can be caused by too much rain or irrigation, which can lead to decay; by too little water; and by irregular water supply, which can, for example, lead to growth cracks. Lack of plant food can affect the quality of fresh produce, causing stunted growth or discoloration of leaves, abnormal ripening and a range of other factors. Too much fertilizer can harm the development and post-harvest condition of produce. Good crop husbandry is important for reducing losses. Weeds compete with crops for nutrients and soil moisture.

16-The passage mentions that

- 1) scarce resources such as water result from a waste of human effort
- 2) there are cases where there is in fact no post-harvest loss at all
- 3) post-harvest chains cause major losses of horticultural produce
- 4) growing conditions do not usually match handling at retail level

17-It is stated in the passage that

- 1) 100% losses happen if the market price of harvest is equal to its cost of harvest
- 2) post-harvest losses are not limited to the way the produce is handled in the soil
- 3) it is, in most cases, impossible to plough the harvest back into the ground
- 4) it used to be difficult to measure post-harvest losses for horticultural produce

18-Which of the following is NOT mentioned in the passage in connection with the potential to affect post-harvest losses?

- 1) 'irrigation'
- 2) 'fertilisers'
- 3) 'crop husbandry'
- 4) 'plant food'

19-The word 'stunted' in the passage (underlined) is best related to

- 1) 'slowed'
- 2) 'damaged'
- 3) 'stopped'
- 4) 'harmed'

20-The best for the passage is

- 1) Post-Harvest Loss and Its Consequences
- 2) How to Avoid Post-Harvest Losses
- 3) Post- and Pre-Harvard Loss
- 4) Causes of Loss after Harvest

PASSAGE 2

The substances that give chilli peppers their intensity when ingested or applied topically are capsaicin and several related chemicals, collectively called capsaicinoids. Capsaicin is the primary ingredient in the pepper spray used as an irritant weapon. When consumed, capsaicinoids bind with pain receptors in the mouth and throat that are responsible for sensing heat. Once activated by the capsaicinoids, these receptors send a message to the brain that the person has consumed something hot. The brain responds to the burning sensation by raising the heart rate, increasing perspiration and release of endorphins. It is now generally accepted that capsaicin alters how the body's cells use energy produced by hydrolysis of ATP. In the normal hydrolysis the SERCA protein uses this energy to move calcium ions into the sarcoplasmic reticulum. When capsaicin is present, it alters the conformation of the SERCA, and thus reduces the ion movement; as a result the ATP energy (which would have been used to pump the ions) is instead released as heat. The "heat" of chilli peppers was historically measured in sugar syrup before its heat becomes undetectable to a panel of tasters. Bell peppers rank at 0 SHU, New Mexico green chillies at about 1,500 SHU, jalapenos at 2,500-5,000 SHU, and habaneros at 300,000 SHU. The modern commonplace method for quantitative analysis of content of a chilli pepper variety. Pure capsaicin is a hydrophobic, colourless, odourless, and crystalline-to-waxy solid at room temperature, and measures 16,000,000 SHU.

21-It is stated in the passage that

- 1) the ingredients in the pepper spray used as irritant weapons contain huge amounts of capsaicin
- 2) capsaicinoids are a group of substances related to the capsaicin derived from chili and red pepper
- 3) increasing perspiration is one result of capsaicinoids binding with pain receptors in the mouth and throat
- 4) chili pepper gives intensity to its substances specially when ingested or applied topically

22-The passage mentions that

- 1) liquid chromatography can measure the capsaicinoid content of the chili pepper
- 2) capsaicinoids are responsible for producing heat in the pepper spray
- 3) the brain can get damaged if too much capsaicinoid is consumed
- 4) SHU is no longer used as a method for measuring "heat" of chili peppers

23-We may understand from the passage that

- 1) the SERCA reduces ion movement in the absence of capsaicin
- 2) hydrolysis moves calcium ingredients into the reticulum

- ۳۱- موزهای پختنی (*Plantain*) از کراس‌های درون‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای به وجود آمده‌اند.
 (۱) *M.acuminata* × *M.textilis*
 (۲) *M.acuminalos* × *M.acuninate*
 (۳) *M.acuminata* × *M.balbisiana*
 (۴) *M.balbisiana* × *M.trxtilis*
- ۳۲- فلاینگ راگون (*Flying dragon*) سلکسیون‌ی از است که برای از آن استفاده می‌شود.
 (۱) نارنج، ایجاد باغ‌های متراکم مرکبات
 (۲) نارنج، کشت مرکبات در خاک‌های شور
 (۳) نارنج سه برگ، ایجاد باغ‌های متراکم مرکبات
 (۴) نارنج سه برگ، کشت مرکبات در خاک‌های شور
- ۳۳- بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکل لیموترش در جنوب ایران در حال حاضر است.
 (۱) بیماری نماتد مولد گره (۲) بیماری جاروک لیموترش (۳) بیماری شانکر باکتری لیمو (۴) بیماری پروتئینی تریستیزا
- ۳۴- در مرکبات ارقام اغلب باردهی منظمی دارند. شدت سال‌آوری در نارنگی نسبت به پرتقال است.
 (۱) بی‌بذر، بیشتر (۲) بذردار، بیشتر (۳) بی‌بذر، کمتر (۴) بذردار، کمتر
- ۳۵- در گیاه گل‌ها از نظر ساختاری *bisexual* هستند اما عملاً به صورت *unisexual* رفتار می‌کنند. هر گل در یک روز دو بار باز می‌شود، مرتبه اول به صورت گل ماده و مرتبه دوم به صورت گل نر عمل می‌کند.
 (۱) گواوا (۲) پاپایا (۳) آناناس (۴) آووکادو
- ۳۶- عارضه خشکیدگی خوشه خرما است.
 (۱) گرمای بالا و رطوبت نسبی پایین
 (۲) نامنظم و نامتعادل بودن برنامه تغذیه
 (۳) تراکم بالای کاشت
 (۴) شدت نور بالا
- ۳۷- تابستان خنک مشکلات پسته می‌شود.
 (۱) طولانی شدن دوره رشد رویشی و افزایش خطر سرمای زودرس پاییز
 (۲) عدم تکامل مغز و تأخیر در زمان رسیدن میوه و در نهایت کاهش محصول
 (۳) رشد رویش زیاد و طولانی مدت و ممانعت از تشکیل گل
 (۴) عدم تکامل مغز و زودرس شدن محصول
- ۳۸- پایه پسته، تحمل سرمای بالاتری در پیوندک‌القاء می‌کنند.
 (۱) UCBI (۲) اتلانیتیکا (۳) اینتگریمما (۴) تربینتوس
- ۳۹- تنش خشکی در زمان تمایزبایی جوانه‌های زیتون عارضه به دنبال دارد.
 (۱) سقط گل آذین در جوانه
 (۲) ناقص شدن پرچم‌ها
 (۳) افزایش تعداد گل در گل آذین
 (۴) تولید گل آذین‌های کوچک و غیربارور
- ۴۰- محصول دوم انجیر *Sanpedro* با گرده محصول انجیر گرده‌افشانی می‌شود.
 (۱) به طریق پارتنوکاری رویشی
 (۲) *Profichi*
 (۳) *Mamoni*
 (۴) *Mame*
- ۴۱- در شرایط دمایی کمتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد از گروه توت‌فرنگی گل می‌دهند.
 (۱) معمولاً تمام ارقام و گونه‌ها
 (۲) ارقام روز خنثی
 (۳) ارقام روز کوتاه
 (۴) گونه *Fragaria vesca*
- ۴۲- در چه شرایطی تعداد پاجوش (*Branch crown*) توت‌فرنگی افزایش می‌یابد؟
 (۱) با بلند شدن طول روز و دمایی پایین در اواخر بهار
 (۲) با کوتاه شدن طول روز و دمایی پایین در اوایل بهار
 (۳) با کوتاه شدن طول روز و دمایی پایین در اوایل پاییز
 (۴) با بلند شدن طول روز و دمایی بالا در اوایل تابستان
- ۴۳- برای تولید توت‌فرنگی در گلخانه، نسبت نیتروژن به پتاسیم برابر است با نسبت در اوایل رشد و همراه با شروع میوه‌دهی این نسبت
 (۱) زیاد، کاهش می‌یابد. (۲) کم، افزایش می‌یابد.
 (۳) زیاد، تغییر نمی‌کند. (۴) پایین، تغییر نمی‌کند.
- ۴۴- از پایه انگور حساس به فیلوکسرا می‌باشد.
 (۱) *Vitis berlandieri* (۲) *Vitis rupestris* (۳) *Vitis vinifera* (۴) *Vitis riparia*
- ۴۵- در انگورهای با خوشه متراکم (یا قوتی) کاربرد جیبرلیک اسید در زمان توصیه می‌شود.
 (۱) یک بار قبل و سه بار سپس از باز شدن گل‌ها
 (۲) قبل و پس از باز شدن گل‌ها
 (۳) پس از باز شدن گل‌ها
 (۴) قبل از باز شدن گل‌ها
- ۴۶- برای شرایط ایران در مجموع کدام روش ترتیب کیوی را ترجیح می‌دهند؟
 (۱) روش یا چراغی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کم است.
 (۲) روش تربیت T-bar است.
 (۳) روش‌ها تفاوتی با یکدیگر ندارند.
 (۴) روش پرگولا مناسب‌تر است.

۴۷- گل‌انگیزی در مناطق گرمسیر صورت می‌گیرد.

(۱) در دمای بالا (۲) با کاهش طول روز (۳) با کاهش شدت نور (۴) با کاهش رشد

۴۸- برای جلوگیری از رشد نرک‌ها پس از هرس درختان میوه، هورمون کاربرد دارد.

(۱) NAA (۲) IAA (۳) GA (۴) اتیلن

۴۹- کدام یک از درختان زیر دارای گل منفرد (Solitary) هستند؟

(۱) آلبالو (۲) تمشک (۳) پسته (۴) هلو

۵۰- مشکل اصلی عدم تشکیل میوه زردآلو مناسب چیست؟

(۱) ماده عقیمی - ناسازگاری - سرمازدگی بهاره
 (۲) ماده عقیمی - نر عقیمی - سرمازدگی زمستانه
 (۳) نر عقیمی - ناسازگاری - سرمازدگی پاییزه
 (۴) پارتنوکاری - ناسازگاری - عدم تشکیل مناسب گل در تابستان

۵۱- کدام یک از پایه‌های درختان میوه زیر شرایط غرقاب (waterlogging) را بهتر تحمل می‌کند؟

(۱) آلوی میرو بالان (۲) هلوی میسوری (۳) پایه بذری بادام (۴) هیبرید GF677

۵۲- مکانیسم اصلی سال آوری سیب کدام مورد است؟

(۱) ریزش جوانه‌های گل به دلیل رقابت میوه‌های در حال رشد
 (۲) عدم تشکیل جوانه گل به دلیل سایتوکینین و آپسیژیک اسید بذرها
 (۳) عدم تشکیل جوانه گل به دلیل دریافت نکردن کربوهیدرات کافی
 (۴) عدم تشکیل جوانه گل به دلیل تولید جیبرلین در بذرها میوه
 ۵۳- به چه دلیل، درختان سیب از نظر گستره جغرافیایی، در مناطق بیشتری نسبت به درختان گلابی، پرورش می‌یابند؟

(۱) تنوع بالاتر رقم و نیاز سرمایی کمتر
 (۲) حساسیت کمتر به آتشک و نیاز سرمایی کمتر
 (۳) نیاز سرمایی بیشتر و مقاومت به سرمای بالاتر
 (۴) مقاومت به سرمای بالاتر و حساسیت کمتر به آتشک در آب و هوای مرطوب

۵۴- کدام یک از ترکیبات زیر در باردهی (fruit set) درختان میوه کمتر استفاده می‌شود؟

(۱) اوره (۲) سولفات آهن (۳) سولفات روی (۴) اسید بوریک

۵۵- کدام یک از اهداف اصلاحی زیر در اکثر درختان میوه معتدله مشابه است؟

(۱) تولید درختانی که در اواخر زمستان یا اوایل بهار گل می‌دهند (Early flowering)
 (۲) تولید درختانی که برگ‌های آن‌ها در پاییز دیرتر می‌ریزند. (Late feat fall)
 (۳) تولید درختانی که پس از کاشت درخت زودتر به بار می‌نشینند. (precocity)
 (۴) تولید درختانی که میوه آن‌ها دیرتر برداشت می‌شود. (Late harvest)

۵۶- کدام یک از درختان سیب، گیلاس، گلابی و پسته نسبت به گرمای تابستان تحمل بیشتری دارند؟

(۱) گیلاس (۲) گلابی (۳) پسته (۴) سیب

۵۷- کدام یک از موارد زیر باعث ایجاد موج‌های گل‌دهی می‌شود؟

(۱) دمای بالا در روز (۲) رشد و نمو سریع شاخه‌ها
 (۳) سرمازدگی در اوایل شکوفه‌دهی (۴) رشد سریع پیش‌آغازهای گل

۵۸- در چه شرایطی مواد شیمیایی برطرف‌کننده خفتگی (نظیر دورمکس Dormex) در از بین بردن خفتگی موثر می‌باشند؟

(۱) زمانی که ۷۰٪ نیاز سرمایی تأمین شده باشد.
 (۲) زمانی که ۳۰٪ نیاز سرمایی تأمین شده باشد.
 (۳) زمانی که ۳۰٪ جوانه‌های درخت شروع به رشد کرده باشند.
 (۴) زمانی که ۷۰٪ جوانه‌های درخت شروع به رشد کرده باشند.

۵۹- در مناطقی با آب و هوای خشک و تابش شدید آفتاب، باید هرس طوری انجام شود که

(۱) از برخورد مستقیم نور به تنه درخت ممانعت شود یعنی مرکز درختان کاملاً باز نشود.
 (۲) حداکثر میوه‌ها در بخش‌های میانی و پایین تاج تشکیل شوند تا میزان آفتاب‌سوختگی سطح میوه کمتر باشد.
 (۳) حداکثر میوه در بخش‌های بالایی و اطراف تاج تشکیل شوند تا میوه‌ها حداکثر رنگ‌گیری را داشته باشند.
 (۴) حداکثر نور به بخش‌های مرکزی و پایین تنه برخورد کند یعنی حتماً از روش تربیت و هرس مرکز باز استفاده می‌شود.

۶۰- تنگ گل و میوه در کدام درخت کمترین تأثیر را در بهبود کیفیت میوه آن درخت دارد؟

(۱) هلو (۲) سیب (۳) گلابی (۴) گیلاس

۶۱- بیشترین فسفر و آهن قابل جذب، به ترتیب (از راست به چپ) در چه pHهایی وجود دارد؟

- (۱) اسیدی- خنثی (۲) اسیدی- قلیایی (۳) خنثی- اسیدی (۴) قلیایی- اسیدی

۶۲- pH خاک‌های شوری که حاوی مقادیر زیادی املاح KCl و NaCl باشند چگونه است؟

- (۱) اسیدی زیاد (۲) قلیایی متوسط (۳) خنثی (۴) قلیایی زیاد

۶۳- از دستگاه تانسیموتر چه استفاده‌ای می‌شود؟

- (۱) برای تعیین دمای خاک
(۲) برای تعیین جرم مخصوص حقیقی خاک
(۳) تعیین مکش رطوبتی خاک در فشار ۱۵ اتمسفر
(۴) تعیین مکش رطوبتی خاک در فشار حدود ۰/۷ تا ۰/۸ اتمسفر

۶۴- جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاکی به ترتیب ۱۳۷۵ و ۲۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. درصد تخلخل این خاک چند درصد است؟

- (۱) ۲۵ (۲) ۴۸ (۳) ۵۰ (۴) ۵۲

۶۵- ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) کدام گروه از کانی‌های زیر بیشترین است؟

- (۱) ایلیت- کلرایت (۲) ایلیت- کائولینایت (۳) اسمکتایت- ورمی کولایت (۴) کائولینایت- کلرایت

۶۶- کدام یک از علائم زیر معرف افق زیر سطحی تجمع رس است؟

- (۱) B_k (۲) E (۳) AB (۴) B_t

۶۷- اصطلاح خاک‌های سبک و سنگین مرتبط با کدام ویژگی خاک است؟

- (۱) بافت (۲) ساختمان (۳) جرم مخصوص حقیقی (۴) جرم مخصوص ظاهری

۶۸- اثر کدام یک از عوامل مؤثر بر تشکیل خاک غالباً با گذشت زمان کاهش می‌یابد؟

- (۱) اقلیم (۲) پستی و بلندی (۳) مواد مادری (۴) پوشش گیاهی

۶۹- چوب‌پنبه‌ای شدن قسمت داخلی سیب و شکاف برداشتن ساقه کرفس می‌تواند به کدام علت باشد؟

- (۱) زیادی عنصر بر (B) (۲) کمبود عنصر مولیبدن (Mo)
(۳) کمبود عنصر بر (B) (۴) زیادی عنصر مولیبدن (Mo)

۷۰- خطر سدیمی شدن خاک در اثر آبیاری با کدام یک از کلاس‌های آب آبیاری بیشتر است؟

- (۱) C_۴S_۱ (۲) C_۴S_۲ (۳) C_۳S_۲ (۴) C_۱S_۴

۷۱- با افزایش pH خاک، جذب یا قابل استفاده بودن کدام گروه از عناصر غذایی افزایش می‌یابد؟

- (۱) Ca, Mg, K (۲) Ca, K, Fe (۳) Ca, Mg, Fe (۴) Mg, K, Fe

۷۲- کدام یک از روابط زیر برای تعیین درصد اشباع بازی به کار می‌رود؟

- (۱) $\frac{\text{بازهای محلولی}}{\text{OEC}} \times 100$
(۲) $\frac{\text{بازهای قابل تبادل}}{\text{CEC}} \times 100$
(۳) $\frac{\text{بازهای قابل تبادل}}{\text{CEC}} \times 100$
(۴) $\frac{\text{بازهای محلول}}{\text{OEC}} \times 100$

۷۳- بافت خاک عبارت است از:

- (۱) درصد حجمی ذرات شن- سیلت و رس
(۲) درصد نسبی ذرات شن- سیلت و رس
(۳) درصد وزنی ذرات شن- سیلت و رس
(۴) مجموع درصد حجمی و وزنی ذرات مذکور

۷۴- خاک‌های اسیدی به احتمال زیاد در کدام رده قرار می‌گیرند؟

- (۱) مالی سول‌ها (۲) الفی سول‌ها (۳) اریدی سول‌ها (۴) اسپودوسول‌ها

۷۵- معمولاً با افزایش واکنش (pH) خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) در غالب خاک‌ها اینگونه تغییر می‌نماید:

- (۱) کاهش می‌یابد (۲) افزایش می‌یابد
(۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد (۴) بدون تغییر است.

۷۶- لایه درون پوست (آندودرم) در کدام دسته از گیاهان زیر مشخص تر است؟

- (۱) ریشه تک لپه‌ای‌ها (۲) ریشه دولپه‌ای‌ها (۳) ساقه تک لپه‌ای‌ها (۴) ساقه دولپه‌ای‌ها

۷۷- هرگاه در بافت کلانشیم (Collenchyme)، یاخته‌ها (Collocytes) توسط مٲا (Mca) از هم جدا باشند و فقط اطراف مٲا دیوار

یاخته‌ها ضخیم شده باشد، مانند کلانشیم ساقه تاتوره (datorea)، این نوع کلانشیم چه نامیده می‌شود؟

- (۱) ساده (۲) گرد یا حلقوی (۳) ورقه‌ای یا مطبق (۴) زاویه‌دار یا گوشه‌دار

۷۸- فرآورده نهایی گلیکولیز چه نام دارد؟

- (۱) گلیسرآلدئید تری فسفات (۲) اسید پیروویک
(۳) فروکتوز (۴) گلوکز

۷۹- در گیاهان C_3 تنفس نوری در کدام یک از شرایط زیر شروع می‌شود؟

- (۱) با کاهش فشار اکسیژن
 (۲) با افزایش درجه حرارت
 (۳) با کاهش شدت نور
 (۴) با افزایش فشار گاز کربنیک

۸۰- رنگ نارنجی درون پر تقال رسیده مربوط است به است.

- (۱) تانن درون کروموپلاست (۲) آنتوسیانین درون واکوئول
 (۳) ترکیبات کاروتنوئید درون واکوئول
 (۴) ترکیبات کاروتنوئید درون کروموپلاست

۸۱- حلقه کاسپاری (Casparian strip) که در بعضی گیاهان وجود دارد در کدام اندام گیاه دیده می‌شود؟

- (۱) ریشه (۲) ساقه
 (۳) برگ (۴) میوه

۸۲- اتیلن در گلدهی کدام گیاه تأثیرگذار است؟

- (۱) آناناس (۲) انجیر
 (۳) کیوی (۴) موز

۸۳- آنزیم‌هایی که انتقال مواد معدنی به درون و به خارج از پروتوپلاسم را کنترل می‌کنند، عمدتاً در چه بخشی از سلول جای دارند؟

- (۱) سیتوپلاسم (۲) میتوکندری (۳) غشاء کلروپلاست (۴) غشاء سیتوپلاسمی

۸۴- واژه پتانسیل اسمزی مترادف کدام یک از این واژه‌ها است؟

- (۱) فشار اسمزی (۲) پتانسیل مکش (۳) پتانسیل فشاری (۴) فشار تورژسانس

۸۵- حرکت جانبی آب در ساقه به وسیله کدام یک از این بافت‌ها صورت می‌گیرد؟

- (۱) آوندهای چوبی (۲) آوندهای آبکش (۳) اشعه آوند چوب (۴) اشعه آوند آبکش

۸۶- انتقال کدام یک از این هورمون‌ها به طول کاملاً آزاد، هم در آوندهای چوبی و هم در آوندهای آبکش صورت می‌گیرد؟

- (۱) اکسین‌ها (۲) ژبیرلین‌ها (۳) سیتوکینین‌ها (۴) اتیلن و مواد مشابه آن

۸۷- در کدام یک از این گیاهان روز بلند با یک چرخه آفتابی، می‌توان طرح اولیه گل را به وجود آورد؟

- (۱) شبت (۲) سیلن (۳) چچم (۴) بارهنگ

۸۸- واژه فلودرم در مورد کدام یک از این بافت‌ها به کار می‌رود؟

- (۱) مجموع پارانشیم پوستی و آبکش ثانویه
 (۲) مجموع پارانشیم پوستی و چوب پنبه
 (۳) آبکش ثانویه
 (۴) پارانشیم پوستی

۸۹- سلول‌های ریشه‌زا در چه محلی قرار دارند؟

- (۱) در آندودرم
 (۲) در سلول‌های پوست ریشه
 (۳) در خارجی‌ترین لایه استوانه مرکزی
 (۴) در استوانه مرکزی بین دسته‌های آوندهای آبکش و آوندهای چوب

۹۰- در سلول‌های کدام یک از این بافت‌ها، کلروپلاست وجود دارد؟

- (۱) اسکلرانشیم (۲) آثرانشیم
 (۳) کلرانشیم (۴) کلانشیم

۹۱- کدام یک از ویژگی‌های پرلایت نمی‌باشد؟

- (۱) جذب آب تا ۴ برابر وزن (۲) ظرفیت تبادل کاتیونی بالا
 (۳) استریل بودن

۹۲- به طور معمول بیشتر از کدام ترکیب برای گندزدایی نمونه‌ها در کشت بافت گیاهی استفاده می‌شود؟

- (۱) کلرید کلسیم (۲) کلرید جیوه (۳) کلراکس (۴) الکل

۹۳- بالاترین مقدار سایتوکاینین در طی مراحل تکامل بذر در کدام مرحله است؟

- (۱) تکثیر سلولی و تمایزیابی (۲) تکثیر سلولی و ذخیره‌سازی
 (۳) ذخیره‌سازی و خشک شدن (۴) تمایزیابی سلولی و خشک شدن

۹۴- کدام حالت زیر در گیاهانی که خودناسازگاری دارند باعث بروز این پدیده می‌شود؟

- (۱) یکپایگی (۲) دو پالگی (۳) ناهم‌رسی (۴) ال‌های S

۹۵- بذرهایی که برای جوانه‌زنی در برابر سرما واکنش نشان می‌دهند اما نیاز مطلق به سرما ندارند دارای چه نوع خفتگی هستند و در چه گونه‌های گیاهی دیده می‌شوند؟

- (۱) میان خفتگی - سوزنی‌برگان (۲) میان خفتگی - پهن‌برگان
 (۳) فیزیولوژیکی - سوزنی‌برگان (۴) فیزیولوژیکی - پهن‌برگان

۹۶- برداشت زودتر بذر در کدام یک از حالات زیر انجام می‌گیرد؟

- (۱) در مورد میوه‌های گوشتی برای جلوگیری از فساد بذر (۲) در مورد میوه‌های خشک قبل از پخش بذر آنها
 (۳) در مورد بذره‌های حساس قبل از جوانه‌زنی بذر (۴) در مورد بذرهایی که پوسته سخت تولید می‌کنند.

۹۷- رکود درون‌زاد بذر ناشی از کدام یک از حالات زیر است؟

- (۱) مواد بازدارنده در تخم‌کپوش (۲) پوسته غیرقابل نفوذ
 (۳) جنین‌های نابالیده (۴) آندوسپرم سخت

۹۸- Paradormancy را می‌توان تا حدودی متفاوت با کدام واژه در نظر گرفت؟

- (۱) Exodormancy (۲) Endodormancy (۳) Physical dormancy (۴) Biochemical dormancy

۹۹- برای آزمون خلوص بذر از کدام یک از روش‌های زیر استفاده می‌شود؟

- (۱) انکوباسیون بذر (۲) پیری تسریع شده (۳) از فنوتیپ بذر (۴) نشت یونی

۱۰۰- در بذره‌های تک‌لپه‌ای، لپه کدام یک از اجزاء زیر است؟

- (۱) Coleoptile (۲) Coleorhiza (۳) Plumule (۴) Scutellum

۱۰۱- کدام یک از عبارات‌های زیر در مورد تقسیم‌بندی بذر صحیح است؟

- (۱) بذر آندوسپرمی براساس مورفولوژی جنین و بذر غیرآندوسپرمی براساس نوع پوشش بذر تقسیم می‌شوند.
 (۲) بذر آندوسپرمی براساس نوع پوشش بذر و بذر غیرآندوسپرمی براساس مورفولوژی جنین تقسیم می‌شوند.
 (۳) بذر آندوسپرمی و غیرآندوسپرمی براساس مورفولوژی جنین تقسیم می‌شوند.
 (۴) بذر آندوسپرمی و غیرآندوسپرمی براساس نوع پوشش بذر تقسیم می‌شوند.

۱۰۲- بذر در مرحله تکاملی رسیدن و خشک شدن، کدام یک از حالات زیر را دارا می‌باشند؟

- (۱) فقط بذره‌های زنده‌زا به صورت خاموش می‌باشند. (۲) یا به صورت خفته و یا به صورت خاموش می‌باشند.
 (۳) بذر در این مرحله به صورت خاموش می‌باشند. (۴) بذر در این مرحله به صورت خفته می‌باشند.

۱۰۳- پدیده چند جنینی (Polyembryony) در کدام یک از گیاهان زیر مشاهده می‌شود؟

- (۱) پسته (۲) گیلاس (۳) انگور (۴) پرتقال

۱۰۴- کدام یک از حالات زیر به عنوان منبع بهتری برای تهیه بذر درختان جنگلی مطلوب‌تر است؟

- (۱) انتخاب اکوتیپ Ecotype selection (۲) انتخاب فامیلی Family selection
 (۳) درختان پلاس Plus trees (۴) انتخاب کلاین Cline selection

۱۰۵- کدام حالت زیر در مورد انتخاب قلمه از گیاه مادری اولویت ندارد؟

- (۱) قلمه از قسمت‌های نونهال تهیه شود. (۲) در حالت فیزیولوژیکی مناسبی باشد.
 (۳) عاری از عوامل بیماری‌زا باشد. (۴) شبیه به تام و نوع باشد.

۱۰۶- کدام یک جزء دلایل استفاده از «تکثیر رویشی» محسوب نمی‌شود؟

- (۱) کنترل مراحل رشد در تکثیر گیاه
 (۲) کوتاه کردن زمان رسیدن زایشی
 (۳) هزینه تکثیر کمتر برای هر گیاه در مقایسه با تکثیر بذری
 (۴) ترکیب بیش از یک نژادگان در یک گیاه

۱۰۷- قلمه‌های گرفته شده از شاخه‌های دارای رشد افقی برخی گونه‌ها، به صورت افقی به رشد خود ادامه می‌دهند. این پدیده اصطلاحاً نامیده می‌شود.

(۱) Orthotropism (۲) Plagiotropism (۳) Ontogenesis (۴) Cyclophysis

۱۰۸- می‌خواهیم ۱۰۰ میلی‌لیتر از ماده تنظیم‌کننده رشد اکسین برای ریشه‌زایی قلمه‌ها به غلظت ۲۰۰۰ppm درست کنیم. مقدار هورمون موردنیاز چند گرم است؟

(۱) ۰/۲ گرم (۲) ۲ گرم (۳) ۲ میلی‌گرم (۴) ۲۰۰۰ میلی‌گرم

۱۰۹- در کدام نوع از پیوندهای زیر، پیوندک فاقد چوب است؟

(۱) پیوند اسکنه (۲) پیوند نیمانیم (۳) پیوند جانبی (۴) پیوند وصله‌ای

۱۱۰- در کدام نوع از بافت ناهمسانی‌های زیر یک بافت از یک نژادگان به صورت لایه نسبتاً نازکی کاملاً یک قسمت درونی را که از نظر ژنتیکی متفاوت است می‌پوشاند؟

(۱) پارافراپوش (۲) نافراپوش (۳) فراپوش (۴) پاره‌ای

۱۱۱- در یک گیاه و نهال بالغ قسمت بیرونی تاج از نظر سن مسن‌ترین گیاه است اما از نظر سن جوان‌ترین قسمت می‌باشد.

(۱) بیولوژیک (Biologic) - کروئولوژیک (Chronologic) (۲) کروئولوژیک (Chronologic) - بیولوژیک (Biologic)

(۳) بیولوژیک (Biologic) - اونتوژنتیک (Ontogenetic) (۴) اونتوژنتیک (Ontogenetic) - بیولوژیک (Biologic)

۱۱۲- دگرسانی (Heteroblasty) به چه مفهوم است؟

(۱) عدم واکنش مریستم انتهایی به محرک‌ها برای آغازیدن گلدهی در دوره نونهالی

(۲) امکان تغییر الگوهای اپی‌ژنتیکی یا ژنتیکی با بهنژادی و گزینش

(۳) دارا بودن برخی ویژگی‌های متفاوت در محیط‌های رشد گوناگون

(۴) تغییرات ناگهانی و با تفاوت‌های مشخص بین دو مرحله نونهالی و بلوغ

۱۱۳- وجود کدام اندام زیر روی قلمه حتماً برای ریشه‌دار شدن قلمه ساقه ضروری است؟

(۱) دم برگ (۲) جوانه (۳) برگ (۴) گل

۱۱۴- پیوند ریشه پرستار «Nurse-root grafting» برای چه هدفی به کار می‌رود؟

(۱) برای ایجاد فرصت کافی جهت ریشه‌دار شدن پیوندک

(۲) برای تسهیل جابه‌جایی درختان پیوند شده

(۳) برای نجات پایه درختانی که در معرض خطر هستند.

(۴) برای افزایش عمر درختان پیوندی

۱۱۵- در گیاهان علفی، تشکیل آغازنده‌های ریشه معمولاً از کدام یاخته‌ها صورت می‌گیرد؟

(۱) پروهای آوندی مغز (۲) لایه زاینده زیر پوست

(۳) یاخته‌های پارانشیمی پوست (۴) یاخته‌های نزدیک به دسته‌های آوندی

۱۱۶- طول نیساک‌های (Rhizome) موجود در یک گیاه چگونه افزایش می‌یابد؟

(۱) با تقسیم و رشد سلولی در کامبیوم ساقه (۲) با تقسیم و رشد سلولی در مریستم انتهایی ساقه

(۳) با رشد مریستم اینترکالاری در قسمت پایین میانگره‌ها (۴) با رشد مریستم انتهایی و مریستم‌های میان‌گره‌ها

۱۱۷- علت استفاده از قلمه‌های پاشنه‌دار در مقایسه با قلمه‌های شاخه‌های یک ساله چیست؟

(۱) وجود مواد ذخیره‌ای بیشتر در چوب‌های مسن و استحکام بیشتر

(۲) وجود آغازنده‌های ریشه از پیش تشکیل شده و مواد ذخیره‌ای بیشتر

(۳) وجود آغازنده‌های ریشه حاصل از زخم و مواد فنلی بیشتر

(۴) وجود مواد فنلی بیشتر در چوب‌های مسن و قطر بیشتر

۱۱۸- کندکننده‌های رشد چگونه باعث افزایش ریشه‌دهی می‌شوند؟

(۱) ضد جیبرالین بودن و افزایش رشد شاخساره (۲) کاهش رقابت مواد غذایی و همساز با اکسین

(۳) کاهش رشد شاخساره و ضد جیبرالین بودن (۴) افزایش رشد شاخساره و همساز با اکسین

۱۱۹- در کدام یک از روش‌های تکثیر از طریق قلمه جهت افزایش کارایی تکثیر از تیمار هورمونی سابتوکینین استفاده می‌گردد؟

(۱) قلمه‌های چوب نرم (۲) قلمه‌های جوانه برگ (۳) قلمه‌های برگ (۴) قلمه چوب سخت

۱۲۰- در صورتی که پایه مادری شیره زیادی تولید کند، کدام کوپیوند مناسب‌تر است؟

(۱) کوپیوند T واژگون (۲) کوپیوند وصله‌ای (۳) کوپیوند T (۴) کوپیوند قاشی

۱۲۱- اگر طول بحرانی شب در گیاهی روز کوتاه، ۱۵ ساعت باشد، کدام یک از چرخه‌های نوری زیر مانع از گلدهی آن می‌شود؟

- (۱) ۸ ساعت نور، ۸ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز، ۸ ساعت تاریکی
- (۲) ۶ ساعت نور، ۲ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز، ۱۶ ساعت تاریکی
- (۳) ۲ ساعت نور، ۲۰ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز، ۲ ساعت تاریکی
- (۴) ۸ ساعت نور، ۱۶ ساعت تاریکی، تابش لحظه‌ای نور قرمز، ۲ ساعت تاریکی

۱۲۲- کارایی مصرف آب به ترتیب از راست به چپ در گیاهان آگاو، ذرت و گوجه‌فرنگی

- (۱) افزایش می‌یابد
- (۲) کاهش می‌یابد.
- (۳) تفاوتی ندارد.
- (۴) بسته به مرحله رشد گیاه متفاوت است.

۱۲۳- باکتری‌های ریزوبیوم، مسئول فرآیند تبدیل به می‌باشد.

- (۱) نیتريت (NO_2^-)، نیترات (NO_3^-)
- (۲) آمونیوم (NH_4^+)، نیترات (NO_3^-)
- (۳) ازت مولکولی (N_2)، آمونیوم (NH_4^+)
- (۴) ازت آلی، آمونیوم (NH_4^+)

۱۲۴- خروج Na^+ از سلول توسط و ورود یون نیترات (NO_3^-) و اسیدهای آمینه به سلول از طریق صورت می‌گیرد.

- (۱) آنتی‌پورتر $\text{H}^+ - \text{Na}^+$ ، سیمپورترهای پروتونی خاص
- (۲) سیمپورترهای پروتونی خاص، آنتی‌پورتر $\text{H}^+ - \text{Na}^+$
- (۳) سیمپورترهای پروتونی خاص، سیمپورترهای پروتونی خاص
- (۴) آنتی‌پورتر $\text{H}^+ - \text{Na}^+$ ، سایر آنتی‌پورترهای خاص

۱۲۵- اگر از مکش ناشی از تبخیر تعرق برگ‌ها صرف‌نظر شود، در آوندی به شعاع ۲۵ میکرومتر، آب تقریباً تا ارتفاع سانتی‌متر به صورت کاپیلاری صعود می‌کند.

- (۱) ۰/۶
- (۲) ۶
- (۳) ۶۰۰
- (۴) ۶۰

۱۲۶- کسر تنفسی در اکسیداسیون اسید استئاریک چه قدر است؟

- (۱) ۰/۷
- (۲) ۱
- (۳) ۱/۲
- (۴) ۱/۶

۱۲۷- اگر سلولی دارای پتانسیل اسمزی ۱۲- بار و پتانسیل فشار ۴- بار باشد، پتانسیل آب آن سلول در فشار یک بار اتمسفر، چه قدر است؟

- (۱) ۷- بار
- (۲) ۸- بار
- (۳) ۱۶- بار
- (۴) ۱۷- بار

۱۲۸- قسمت اعظم آنیون‌هایی که برای ایجاد تعادل بار الکتریکی ناشی از ورود یون پتاسیم به درون سلول‌های محافظ روزنه لازم است از جانب اسید آلی تأمین می‌شود.

- (۱) پیرووات
- (۲) سیترات
- (۳) کلر
- (۴) ملات
- (۱) هوا
- (۲) تنفس سلولی
- (۳) CO_2 محلول در آب
- (۴) دکربوکسیلاسیون ملات

۱۳۰- کدام جمله در ارتباط با کلروفیل فلورسانس صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) با استفاده از آن می‌توان مقدار گرمای ناشی از تابش نور به گیاه را محاسبه کرد.
- (۲) طیف نوری کلروفیل فلورسانس شبیه طیف نوری جذب شده است.
- (۳) با استفاده از آن می‌توان راندمان فتوشیمی گیاه را محاسبه کرد.
- (۴) مقدار نور حاصل از آن بسیار کمتر از کل نور جذب شده است.

۱۳۱- هنگام باز شدن روزنه در گیاهان، و از سلول‌های محافظ رخ می‌دهد.

- (۱) ورود Cl^- و خروج ملات
- (۲) ورود K^+ و خروج Na^+
- (۳) ورود H^+ و خروج K^+
- (۴) خروج H^+ و ورود K^+


۱۳۲- کدام یک از جملات زیر درباره نور و جذب آن توسط رنگدانه‌ها، صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) کلروفیل به طور مؤثری، طول موج‌های نور آبی و قرمز را جذب می‌کند.
- (۲) جذب یک فوتون نور آبی در مقایسه با نور قرمز، کلروفیل را به سطح پرا انرژی تری می‌رساند.
- (۳) به جذب نور توسط رنگدانه‌ها که تابعی از طول موج نور است، طیف عمل (Action Spectrum) اطلاق می‌شود.
- (۴) هنگامی که یک فوتون نور توسط مولکول کلروفیل جذب می‌شود، مولکول کلروفیل به حالت برانگیخته درمی‌آید.

۱۳۳- در صورتی که pH داخل سلول گیاهی افزایش یابد یون‌های آلی می‌شوند.

- (۱) پیرووات تجزیه
- (۲) پیرووات ساخته
- (۳) ملات تجزیه
- (۴) ملات ساخته

۱۳۴- عنصر نیکل (Ni) در آنزیم گیاهی وجود دارد.



Urease (۱) Catalase (۲) Peroxidase (۳) α- amylase (۴)

۱۳۵- تبدیل دو مول ۳- فسفوجلایسرات به ۲ مول گلیسرآلدئید تری فسفات در چرخه کلونین، نیازمند مول ATP و مدل NADPH است.

(۱) ۱۲، ۱۸ (۲) ۶، ۹ (۳) ۶، ۶ (۴) ۲، ۲

۱۳۶- کدام مواد فنلی، باعث طعم تلخ گریپ فروت می گردند؟

(۱) Limonene و Naringenin (۲) Hesperetin و Limonene
(۳) Naringenin و Hesperetin (۴) تجمع اسیدهای فنلی ساده

۱۳۷- در سردخانه های کنترل اتمسفر، کاربرد ندارد.

(۱) سیستم تصفیه (Purge system) (۲) سیستم تکترو (Tectrol system)
(۳) کیسه انبساط (Expansion bag) (۴) سیستم گردش (Recirculation system)

۱۳۸- چه رابطه ای بین ترکیبات فنلی با شاخص های کیفی میوه ها و سبزی ها وجود دارد؟

(۱) اکسیداسیون آنزیمی ترکیبات فنلی باعث افزایش کیفیت میوه ها و سبزی ها می شود.
(۲) ترکیبات فنلی در ایجاد رنگ مطلوب برای میوه ها و سبزی ها موثر هستند.
(۳) ترکیبات فنلی باعث افزایش حساسیت به تنش های اکسیداتیو می شوند.
(۴) ترکیبات فنلی باعث اکسیداسیون آسکوربیک اسید در میوه ها و سبزی ها می شوند.

۱۳۹- علت عارضه فیزیولوژیکی قهوه ای شدن مغز سیب درختی کدام است؟

(۱) انباشته شدن آسکوربیک اسید اکسیداز در مغز سیب (۲) کاهش میزان اکسیژن در مغز سیب درختی
(۳) انباشته شدن اسید سوکسینیک در بافت (۴) انباشته شدن پیرووات در بافت

۱۴۰- براساس نوع اسیدهای چرب، محصول در شرایط طبیعی ماندگاری کمتری دارد.

(۱) پسته (۲) پکان (۳) گردو (۴) فندق

۱۴۱- تکنیک استفاده از مواد جاذب اتیلن، جهت جلوگیری از تولید گاز اتیلن و کاهش ضایعات محصولات باغبانی را می نامند.

(۱) Precooling (۲) Scrubbing (۳) Chilling (۴) Curing

۱۴۲- اسید غالب در کاهو و گوجه فرنگی، به ترتیب و می باشد.

(۱) مالیک، سیتریک (۲) مالیک، مالیک (۳) اگزالیک، مالیک (۴) سیتریک، سیتریک

۱۴۳- ترکیبات و به عنوان نخستین مواد شیمیایی موثر در جهت کنترل پوسیدگی مرکبات استفاده می شوند.

(۱) TB2, Borax (۲) HOPP, SOPP (۳) Biphanyl, SOPP (۴) Borax, کربنات سدیم

۱۴۴- فرمول ضریب حرارتی به ازای تغییرات دمایی، کدام یک از فرمول های زیر می باشد؟

(۱) $Q_{10} = (R_2/R_1)^{10/t_2-t_1}$ (۲) $Q_{10} = (R_2/R_1)^{10/t_2+t_1}$

(۳) $Q_{10} = (R_2 + R_1)^{10/t_2-t_1}$ (۴) $Q_{10} = (R_2 - R_1)^{10/t_2+t_1}$

۱۴۵- دمای بحرانی که باعث اندوخته شدن قند در سیب زمینی شیرین می شود بر حسب °C کدام است؟

(۱) ۱۰ و ۱۵ (۲) ۱۰ و ۱۵ (۳) ۱۵ و ۲۰ (۴) ۱۰ و ۵

۱۴۶- مهم ترین ترکیب فرار در میوه نارنگی و پرتقال می باشد.

(۱) متیل آنترانیلات و تیمول (۲) متیل بوتیرات

(۳) ۲- هگزانال (۴) هگزانول

۱۴۷- آنزیم PG باعث نرم شدن بافت میوه در زمان رسیدن می شود.

(۱) با هیدرولیز اتصال های $\alpha(1-4)$ اسید گالاکترونیك در پکتین ها

(۲) با هیدرولیز اتصال های $\beta(1-4)$ اسید گالاکترونیك در پکتین ها

(۳) با جلوگیری از عمل اتیلن در رسیدن میوه

(۴) با هیدرولیز نشاسته در بافت میوه

۱۴۸- کدام یک از میوه های زیر دیرتر به اوج فرازگرا می رسد؟

(۱) موز (۲) سیب (۳) گلابی (۴) آوآکادو

۱۴۹- کدام یک از موارد زیر در مورد لکه تلخ صحیح نمی باشد؟

(۱) محلول پاشی باکلور کلسیم، باعث کاهش لکه تلخ در سیب می شود.

(۲) رقم گرانی اسمیت به لکه تلخ حساس است.

(۳) میوه های نارس، به لکه تلخ حساس تر هستند.

۴) میوه‌های سیب بزرگ‌تر، به لکه تلخ حساس‌تر هستند.

۱۵۰- کدام یک از ترکیبات زیر ممکن است از چرخه تنفس هوازی خارج شود؟

Citrate (۴)

Malate (۳)

Succinate (۲)

Oxaloacetate (۱)



۱۵۱- یک مسئله عمده در مورد استفاده از بذر حقیقی سیب زمینی چیست؟

- (۱) انبارداری این ارقام ضعیف است.
- (۲) بیماری‌های ویروسی از طریق بذر حقیقی منتقل می‌شود.
- (۳) عملکرد ارقامی که فعلاً با بذر حقیقی تکثیر می‌شوند کم است.
- (۴) در اثر کاشت بذر حقیقی محصول زودرس می‌شود.

۱۵۲- وجود کدام یک از موارد زیر موجب تیره شدن رنگ (واکنش Mailard) در فرآورده‌های سرخ کردنی یا چیپس سیب زمینی می‌شود؟

- (۱) نشاسته زیاد
- (۲) ماده خشک زیاد
- (۳) مواد معدنی زیاد
- (۴) گلوکز و فروکتوز زیاد

۱۵۳- علت عدم رشد و ریزش غلاف‌ها در لوبیا سبز چیست؟

- (۱) هوای بسیار گرم و خشک و شرایط وزش باد زیاد
- (۲) آبیاری زیاد و هوای سرد
- (۳) آبیاری زیاد و هوای گرم
- (۴) آبیاری کم و هوای گرم

۱۵۴- کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

- (۱) آندیو گیاهی خود گشن می‌باشند.
- (۲) شیکوره گیاهی خودگشن می‌باشد.
- (۳) آندیو و شیکوره هر دو خودگشن می‌باشند.
- (۴) آندیو و شیکوره هر دو دگرگشن می‌باشند.

۱۵۵- کدام گزینه درباره بولتینگ و ظهور ساقه گلدهنده پیاز صحیح می‌باشد؟

- (۱) بولتینگ پیاز بیشتر متأثر از فنوپریود است تا دما
- (۲) قطر گوی کمتر از ۱۶ میلی‌متر به بولتینگ حساس نخواهد شد.
- (۳) مناسب‌ترین دما در القا بولتینگ دمای بین ۱۰-۵ درجه سانتی‌گراد است.
- (۴) دمای پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد موجب تسریع بولتینگ می‌شود.

۱۵۶- یکی از علل سفید شدن بافت گوشت میوه گوجه‌فرنگی چیست؟

- (۱) زیادی پتاسیم
- (۲) کمبود پتاسیم
- (۳) زیادی کلسیم
- (۴) کمبود کلسیم

۱۵۷- کدام یک از اندام‌های زیر منشأ تشکیل اندام خوراکی در سبزی *Brassica oleraceae var. gongylodes* است؟

- (۱) ساقه
- (۲) ریزوم و ریشه
- (۳) ریشه و هیپوکوتیل
- (۴) هیپوکوتیل و ریزوم

۱۵۸- اگر موقع انتقال نشاءهای کلم چینی از شاسی به مزرعه اندازه آن‌ها بزرگ یا مسن شده باشند چه مشکلی پیش می‌آید؟

- (۱) گلدهی به تأخیر می‌افتد.
- (۲) اکثر نشاءها از بین خواهد رفت.
- (۳) رشد سریع‌تر و محصول پیش رس می‌شود.
- (۴) رکود در رشد گیاه حاصل شده و خطر به گل رفتن افزایش خواهد یافت.

۱۵۹- بخش خوراکی کلم تکمه را چه می‌نامند؟

- (۱) Curd
- (۲) Sprout
- (۳) Head
- (۴) Clove

۱۶۰- کدام یک از سبزی‌های زیر دارای مجموع حرارتی کمتری برای جوانه‌زنی بذر هستند؟

- (۱) *Pisum sativum*
- (۲) *Lactuca sativa*
- (۳) *Lepidium sativum*
- (۴) *Lycopersicon esculentum*

۱۶۱- علت اصلی افزودن ملاس چغندر قند به کمیوست قارچ دکمه‌ای چیست؟

- (۱) کاهش pH
- (۲) افزایش pH
- (۳) افزایش $\frac{C}{N}$
- (۴) تحریک فعالیت باکتری‌ها

۱۶۲- هدف اصلی کاربرد مالچ‌های پلاستیکی سیاه‌رنگ در هندوانه چیست؟

- (۱) تولید محصول تمیزتر
- (۲) زودرس شدن محصول
- (۳) کاهش مشکل علف‌های هرز
- (۴) کاهش عارضه پوسیدگی گلگاه

۱۶۳- کدام یک از روش‌های زیر برای کنترل بیماری فتنق ریشه کلم (club root) مؤثر نمی‌باشد؟

- (۱) ضد عفونی نشاءها با قارچ کش
- (۲) کشت در زمین‌های دارای pH قلیایی
- (۳) تناوب کاشت با محصولات غیر حساس
- (۴) پیوند بر روی پایه‌های مقاوم به قارچ عامل این بیماری

۱۶۴- خاک دادن بوته‌های تره‌فرنگی و کرفس برای چیست؟

- (۱) سرپا نگهداشتن بوته‌ها
- (۲) افزایش ریشه‌دهی و در نتیجه افزایش عملکرد
- (۳) جلوگیری از حمله جوندگان به قسمت‌های مصرفی این دو محصول
- (۴) روشن شدن رنگ (کاهش تجمع کلروفیل) و افزایش کیفیت محصول

۱۶۵- در کدام یک از سبزیجات زیر، کاشت عمیق نشاء جایز نمی‌باشد؟

- (۱) کلم گل
- (۲) کرفس
- (۳) تره‌فرنگی
- (۴) گوجه‌فرنگی

۱۶۶- کدام دسته از گیاهان زیر دارای گل‌های مقاوم‌تری به سرما هستند؟

- (۱) سیلن - بنفشه - همیشه بهار
 (۲) سیلن - همیشه بهار - قرنفل
 (۳) بنفشه - همیشه بهار - تاج‌الملوک
 (۴) تاج‌الملوک - همیشه بهار - قرنفل

۱۶۷- تولید گیاهان هاپلوئید در گل‌های زینتی به چه منظوری است؟

- (۱) به منظور تولید گیاهان عاری از ویروس
 (۲) گیاهان کوچک‌تر که در گلکاری کاربرد دارند.
 (۳) برای تولید گیاهان کاملاً همگن و یکنواخت
 (۴) برای تولید گیاهان با کیفیت برتر

۱۶۸- *Tagetes patula* و *Portulaca grandiflora* به ترتیب از راست به چه نام علمی و است.

- (۱) گل حنا - جعفری آفریقایی (۲) گل ناز - جعفری فرانسوی
 (۳) مینا یک ساله - گل تکمهای
 (۴) شاه‌پسند - نازیخی

۱۶۹- کدام دو محصول زیر از محصولات مهم گل در فصل زمستان می‌باشند؟

- (۱) رز و جعفری
 (۲) به ژاپنی و میخک
 (۳) مینا چمنی و یاس زرد
 (۴) سیکلامن ایرانی و بنت قنسول

۱۷۰- زمان برداشت گل ژربرا و گلایول به ترتیب است.

- (۱) باز شدن گل‌های لوله‌ای - باز شدن دو گلچه بالائی
 (۲) باز شدن گل‌های زبانه‌ای - باز شدن کامل ۳ گلچه پایینی
 (۳) باز شدن ۲ ردیف بیرونی گل‌های لوله‌ای و نمایان شدن گرده - رنگ انداختن بیش از دو گل پایینی
 (۴) باز شدن کامل گل‌های لوله‌ای و نمایان شدن گرده در گل‌های زبانه‌ای - رنگ انداختن دو گلچه میانی و باز شدن چهار گلچه پایینی

۱۷۱- تعداد و طول میانگره‌ها به ترتیب از راست به چه وابستگی زیادی به و دارد.

- (۱) ADT و DIF
 (۲) ADT و DIF
 (۳) ADT و ADT
 (۴) DIF و DIF

۱۷۲- ، از چمن‌های بسیار مناسب کشت در ساحل دریاها با آب شور می‌باشد.

- (۱) Seashore Cynodon
 (۲) Seashore Paspalum
 (۳) seashore Zoysia
 (۴) Seashore Buchloe

۱۷۳- در محدوده تحمل دمایی گل‌های یک ساله، دمای پایین سبب می‌شود.

- (۱) کوتاه و ضخیم شدن ساقه‌ها
 (۲) بلند و باریک شدن ساقه‌ها
 (۳) بلند و ضخیم شدن ساقه‌ها
 (۴) کوتاه و باریک شدن ساقه‌ها

۱۷۴- در سوخ‌های بهار گل، استراحت سوخ در چه شرایطی رخ می‌دهد؟

- (۱) خشکی خاک و دمای پایین هوا
 (۲) دمای بالای هوا و خشکی خاک
 (۳) دمای بالای هوا و رطوبت بالای خاک
 (۴) رطوبت بالای خاک و دمای پایین هوا

۱۷۵- نگونسار گل (سیکلامن ایرانی) پس از تشکیل چند برگ و از محور کدام برگ شروع به گلدهی می‌کند؟

- (۱) ۶ تا ۸ برگ - برگ ششم
 (۲) ۶ تا ۸ برگ - برگ هشتم
 (۳) ۱۰ تا ۱۳ برگ - برگ ششم
 (۴) ۱۰ تا ۱۳ برگ - برگ هشتم

۱۷۶- برای تولید گل با کیفیت و با رنگ ماندگار براکنه‌های بنت قنسول (سرخ برکه) بایستی از چه تیماری استفاده نمود و آن را تا

چه زمانی ادامه داد؟

- (۱) روز کوتاه - ریزش دانه‌های گرده
 (۲) روز کوتاه - مشاهده Cyathium
 (۳) روز بلند - ریزش دانه‌های گرده
 (۴) روز بلند - مشاهده Cyathium

۱۷۷- کدام گروه از گونه‌های گیاهی زیر دارای برگ مرکب شانه‌ای هستند؟

- (۱) مورد، افراسیاه، ابریشم مصری، زبان گنجشک
 (۲) پیچ گلیسین، درخت پروانه، پیچ اناری، درخت پر
 (۳) درخت ابریشم، افاقیا، لیلکی، پیچ گلیسین
 (۴) نخود درختی، افاقیا، انار زینتی، درخت پروانه

۱۷۸- اصطلاح *Stenting* مربوط به است.

- (۱) عمل ضد عفونی نمونه‌ها در کشت بافت
 (۲) نمونه مورد استفاده در کشت بافت
 (۳) انجام پیوند روی قلمه‌های جوان نسترن
 (۴) انجام پیوند کاکتوس‌های رنگی بر روی سرئوس

۱۷۹- کدام عبارت برای گیاه *Begonia Semperflorence* صحیح می‌باشد؟

- (۱) این گیاه ریزوم‌دار بوده و به کمک قطعات برگ‌گی (قلمه برگ) تکثیر می‌شود.
 (۲) این گیاه ریشه‌های افشان داشته و بدون تولید بذر فقط با قلمه برگ‌گی تکثیر می‌گردد.
 (۳) این گیاه دارای ساقه غده‌ای است و در هوای آزاد به عنوان یک گل تابستانه کشت می‌گردد.
 (۴) گیاهی است با ریشه‌های افشان که به راحتی تولید بذر نموده و با قلمه ساقه تکثیر می‌شود.

۱۸۰- بذرگیری در گیاه سیکاس چگونه است؟

- (۱) گیاهی است که پایه‌های نر و ماده از هم جدا بوده و گرده‌افشانی به صورت مصنوعی صورت می‌گیرد.
 (۲) گیاهی است که گل‌های نر و ماده بر روی یک پایه قرار دارند و بذرها خودگشن تولید می‌نماید.

۳) گیاهی است که گل‌های نر عقیم داشته و همواره تولید بذرهای عقیم می‌نماید.
۴) گیاهی است که اصلاً تولید بذر نداشته و به روش‌های رویشی تکثیر می‌گردد.

